

Dessa tre arter har hattar med prickar på. Men prickarna kan lätt lossna och helt eller delvis saknas.



### Röd flugsvamp

*Amanita muscaria*

Hatt 10-25 cm. Hattfärgen kan variera från starkt rött till blekare orangerött. Prickarna är vita. Foten har en kraftig ring och nedre delen av foten är uppsvälld. Växer i lövskog och barrskog.



### Brun flugsvamp

*Amanita muscaria var. regalis*

Den bruna till gulbruna hatten är 10-20 cm och har vitgula prickar. Foten har tydlig ring och nedre delen av foten är uppsvälld. Växer i barrskog.



### Panterflugsvamp

*Amanita pantherina*

Hatten är 5-12 cm och går i bruna nyanser. Prickarna är vita, ringen på foten kan ibland saknas. Nedre delen av foten är uppsvälld. Växer vanligen i lövskog och parker, men ibland även i barrskog.

### Giftets verkan och symtom

Alla dessa svampar innehåller gift som stör nervsystemet. Yrsel, förvirring, oro, sänkt medvetande och kramper kan uppkomma. Ibland även illamående och kräkningar.

### Hur lär du dig mer om svamp ?

- Försök att komma med på en svampkurs eller utflykt. Det finns både studieförbund och föreningar som anordnar sådana.
- Bra hemsidor: [www.svampkonsulent.se](http://www.svampkonsulent.se)  
[www.svampguiden.com](http://www.svampguiden.com)



Broschyren är utarbetad av Giftinformationscentralen och Svampkonsulenternas riksförbund



# De farligaste giftsvamparna i Sverige!



## STOP!

- Plocka inga svampar som liknar dem i broschyren!
- Ta bara svampar som du säkert känner igen!
- Provsma inte! Även giftig svamp kan smaka gott!
- Låt endast svampkunnig vuxen rensa svampen!
- Skaffa en modern svampbok!



Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation – dygnet runt. Ring 010-456 6700 i mindre brådskande fall. [www.gic.se](http://www.gic.se)



## Vit flugsvamp

*Amanita virosa*

Hela svampen är vit. Hatt 5-12 cm. På foten sitter en ring, ibland kan ringen saknas. När flugsvamparna är riktigt unga liknar de ett ägg. Nedre delen av foten, som ofta sitter långt ner i mossan, är uppsvälld. Vit flugsvamp växer i mossig barrskog och i bokskog.

### Giftets verkan och symtom

Giftet skadar levern. Tecken på förgiftning är vattentunna diarréer, illamående och kräkningar som börjar många timmar efter svampmåltiden. Risken för allvarlig leverskada är stor. Förgiftningen kan leda till döden.

## Lömsk flugsvamp

*Amanita phalloides*



Hatt 5-12 cm. Hattfärgen kan variera en del, från nästan helt vit till grönaktiga eller grå och ljusbruna nyanser. Skivorna är vita. Foten har en tunn ring, som ibland saknas. Nedre delen av foten är uppsvälld. Lömsk flugsvamp växer i lövskog, blandskog (löv- och barrträd växer tillsammans) och på ängsmarker med bok, ek och hassel.

### Giftets verkan och symtom

Innehåller samma gift som den vita flugsvampen. Ger samma symtom och är lika farlig – se ovan!



## Toppig giftspindling

*Cortinarius rubellus* (*C. speciosissimus*)

Hatt 4-8 cm. Hela svampen är rödbrun till gulbrun. Hatten är ofta toppig, men inte alltid. Växer i mossig barrskog och i bokskog. En snarlik art som innehåller samma gift är orangebrun giftspindling (*C. orellanus*). Den växer i lövskog med ek, bok och hassel.

### Giftets verkan och symtom

Giftet skadar njurarna som kan bli helt förstörda. Tecken på förgiftning uppkommer inte förrän efter flera dagar. Dessa kan vara illamående, kräkningar, ökad törst, muskelsmärk, ökade eller minskade urinmängder. Den förgiftade kan behöva få dialysbehandling under lång tid och kanske en njurtransplantation.

## Stenmurkla

*Gyromitra esculenta*



Stenmurkla hör till en helt annan grupp av svampar. Hatten är 4-12 cm, brun, rundad och veckad. Foten kan variera i färg, i ljusa grå, bruna eller svagt violetta nyanser. Stenmurklan växer om våren från april tills björken slagit ut, ofta längs skogsvägar, vid rotvärtor eller på hyggen.

### Giftets verkan och symtom

Giftet stör nervsystemet och kan också skada blodkropparna och levern. Tecken på förgiftning är yrsel, dubbelseende och sluddrigt tal. Illamående och magont kan också förekomma.